

ENQUÊTE DEPISTAGE 2014 EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

Cyril Rousseau

Cellule d'intervention en région Occitanie (Cire), Montpellier
pour l'ensemble du comité de pilotage

Congrès XVII^e CONGRÈS SFLS – 6 et 7 octobre 2016, Montpellier




Cet intervenant :

✓ a déclaré ses liens d'intérêt

Tous les orateurs ont reçu une déclaration de liens d'intérêt.

• CONTEXTE

- augmentation de l'incidence du VIH et des IST en 2012
- conduites sexuelles à risque et consommations de substances ?



• OBJECTIFS

- décrire caractéristiques et comportements des consultants en CDAG – Ciddist de la région Languedoc-Roussillon en 2014
- étudier la consommation de substances psycho-actives (SPA)

- **ENQUÊTE MULTICENTRIQUE, 12 CDAG / CIDDIST**

Montpellier, Béziers, Sète, Nîmes, Alès, Bagnols, Carcassonne, Narbonne, Perpignan

- **INCLUSION DE TOUT CONSULTANT** (hors rendu résultat)


Questionnaire auto-administré

- **ANALYSE DESCRIPTIVE**

- sexualité, prises de risque, tests VIH, estimation du risque VIH
- substances psycho-actives (SPA)
- profils de consommation

- **ASSOCIATION ENTRE PRISE DE RISQUE SEXUEL ET SPA**

- prise de risque sexuel approchée par l'utilisation de préservatif dans les 12 mois pour les pénétrations avec les partenaires occasionnels
- régression logistique multinomiale : estimation des OR ajustés



Participation 87 % (5368 / 6137)

Genre

- hommes 2993 (54%)
- femmes 2365
- transgenre 4
- total 5362

Age

- médian : 24 ans
- moyen : 27,5 [13 ; 78]

Nationalité

- française 85,2%
- Europe de l'Est 3 %
- Afrique nord 2%
- Afr. sub-saharienne 2%

GENRE ET ORIENTATION SEXUELLE

		n	%
Hommes	homosexuels	402	7,5
	bisexuels	169	3,1
	hétérosexuels	2366	44,1
	total hommes	2937	54,7
		n	%
Femmes	homosexuelles	25	0,4
	bisexuelles	117	2,2
	hétérosexuelles	2167	40,4
	total femmes	2309	45,3
Total		5246	100,0

PRÉSERVATIF AVEC PARTENAIRE OCCASIONNEL (PÉNÉTRATION)

Utilisation préservatif (N=2631)			
	Toujours	Souvent	Irrégulier / jamais
Hommes			
hétérosexuels (n= 1066)	44%	23%	33%
homo-/bisexuels (n= 342)	53%	23%	24%
Femmes			
hétérosexuelles (n=881)	38%	29%	32%
homo-/bisexuelles (n=80)	41%	20%	39%

p = 0,015

FRÉQUENCE DES CONSOMMATIONS DE SPA



	Régulier	Mois	Année	Expé.	Total	Atlas Inpes LR
Cannabis (n=2597)	15%	13%	12%	11%	51%**	55%**
Poppers solvants (n=785)	<1%	2%	3%	9%	15%	8%
Cocaïne,ecstasy,amphé (n=1049)	2%	4%	5%	9%	20%**	16%**
Hallucinog. kétamine lsd (n=604)	<1%	1%	3%	6%	11%	5%
GHB-GBL (n=97)	<1%	<1%	<1%	1%	2%	
Héroïne (n=158)	<1%	<1%	<1	2%	3%	
Cathinones (n=59)	<1%	<1%	<1%	<1%	1%	
Autres prod.synthèse (n=194)	1%	<1%	1%	3%	5%	

*Atlas 2010 INPES L-R (15 -30 ans) ** Supérieur à la moyenne nationale

Nombre de substances consommées dans les 12 derniers mois

	N	% consommateurs
Une substance	1480	68%
Deux substances	360	16%
Trois substances	212	10%
Quatre à huit substances	133	6%


AUTO-EVALUATION DU RISQUE VIH



UN RISQUE PERÇU QUI VARIE AVEC GENRE ET ORIENTATION SEXUELLE

MAIS PAS OU PEU SELON LES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES CONSOMMÉES

PROFILS DE CONSOMMATION DES SUBSTANCES PSYCHO-ACTIVES



FACTEURS ASSOCIÉS À LA PRISE DE RISQUE SEXUEL ET PRISE DE SPA

Variables explicative	Variables à expliquer	N	P Chi2	OR	ICà95%	P. value
Cocaïne réguliers, Hallucinogènes mois, Héroïne régulier ou mois		207	0.0001			
Non				1		
Oui	Souvent			1.07	0.67-1.70	0.7708
	Irrégulier			1.89	1.24-2.87	0.0028
	Jamais			2.89	1.79-4.67	<.0001
Cocaïne, Hallucinogènes, poppers dans l'année		499	0.0110			
Non				1		
Oui	Souvent			1.60	1.21-2.12	0.0010
	Irrégulier			1.30	0.96-1.76	0.0849
	Jamais			1.16	0.78-1.73	0.4673

FACTEURS ASSOCIÉS À LA PRISE DE RISQUE SEXUEL ET PRISE DE SPA

Variables explicative	Variables à expliquer	N	P Chi2	OR	ICà95%	P. value
Expérimentateurs de cocaïne, hallucinogènes, poppers		872	0.0050			
Non				1		
Oui	Souvent			1.36	1.08-1.71	0.0097
	Irrégulier			1.49	1.17-1.89	0.0011
	Jamais			1.19	0.87-1.63	0.2868
Cocaïne mois, poppers régulier et mois		298	0.0012			
Non				1		
Oui	Souvent			1.55	1.06-2.26	0.0224
	Irrégulier			2.09	1.45-3.02	<.0001
	Jamais			1.39	0.84-2.32	0.2058

UNE CONSOMMATION MARQUÉE DE SUBSTANCES PSYCHO-ACTIVES CHEZ LES USAGERS DES CEGIDD

- stimulants « cocaïne ecstasy amphétamines », les poppers, et hallucinogènes, polyconsommations
- spécificités de certains sous-groupes ie femmes bisexuelles

UNE ASSOCIATION ENTRE CONSOMMATIONS DE SPA ET PRISE DE RISQUE SEXUEL

=> Intégrer les SPA dans les pratiques de dépistage / counselling

=> Un usage adapté du préservatif dans le cadre d'une prévention diversifiée

=> Une prévention adaptée à des groupes ciblés

COMITÉ DE PILOTAGE RÉGIONAL

- I Brosson, V Tribout, J Verdier, CDAG Nîmes, Montpellier, Perpignan
- M Ferreyra, H Aumaître, CH Perpignan
- E de Carvalho, Sida info Service
- C Favier, M Faure, Corevih L-R
- H Peyrière, J-M Jacquet, CHU Montpellier
- J Derrien, V Lugaz, Enipse
- F Le Gal , Le Refuge
- J Reynes, CHU Montpellier

ENSEMBLE DES ÉQUIPES DES CEGGID...ET LES USAGERS...

EQUIPES SANTÉ PUBLIQUE FRANCE

- M Watt, Montpellier
- M Hamon, F Pierre, Montpellier
- S Le Vu, A Velter, Paris

