CO CONSTRUCTION D'UN MODULE D'E-LEARNING SUR LA DISPENSATION D'AUTOTESTS VIH A L'OFFICINE

16ème congrès SFLS – Nantes

Jeudi 8 octobre 2015

Groupe médicament/pharmaciens SFLS

Elaboratio

Des **supports de formation** adaptés aux officinaux et personnalisables par les formateurs sont élaborés

Janvier 2015 → Mai 2015
Diaporamas SFLS
Module 1: prévention et autotests VIH à l'officine
Module 2 : prise en charge des PVVIH à l'officine

Mars 2015 → Juillet 2015
Fiche pratique Cespharm / SFLS

Mai 2015 → Juillet 2015
Formation en e-learning
Maformationofficinale / SFLS

D piement

Partagés gratuitement **en ligne** pour un accès large: http://www.sfls.aei.fr/Commission-pharmaciens-medicaments

F difiables des diaporamas transmis aux **COREVIH** qui peuvent s'associer à des opér mation pour é et

Partage possible a ation

Appropriation des suppo

Mai 2015: l'équipe « Ma Formation Officinale » nous contacte (via une pharmacienne de La Réunion suivant des formations MFO) et nous propose une collaboration pour concevoir un module en e-learning sur la base du diaporama SFLS.

METHODE

- **Mai – Juin 2015: Elaboration du support et scénarisation (SFLS et MFO)**

- **Juillet 2015: Production en e-learning (MFO)**

- **15 juillet 2015: Diffusion (site MFO, lien SFLS)**

- **Suivi des apprenants (MFO et SFLS):**
  - **Réception des commentaires**
  - **Réponse aux questions individuelles des apprenants**
  - **Envoi d'un questionnaire d'auto évaluation 2 semaines après le suivi du module**

- **Actualisation régulière du module (MFO et SFLS)**
- **Partage des réponses aux questions les plus fréquentes**

- **NB**: partenariat formalisé (convention SFLS / MFO) mais aucune contrepartie financière n'est engagée

maformationofficinale.com

MAFORMATION OFFICINALECOM

Mon espace

ACCUEIL | NOS FORMATIONS | LA PÉDAGOGIE | TUTORAT | AUTEURS | MODALITÉS DE FINANCEMENT | DPC | RECRUTEMENT | CONTACT

SEPTEMBRE 2015

AUTOTESTS VIH

DISPONIBLES EN PHARMACIE

Les équipes officinales doivent être préparées à les dispenser.

ÊTES-VOUS PRÊTS ?

OFFERT
NOUVEAU MODULE EN LIGNE
FORMEZ-VOUS

INFOS CERTIFICATIONS

DÉMO EN LIGNE

Sur rendez-vous, une présentation en ligne PERSONNALISÉE pour chaque officine

Prendre rendez-vous

L'ophtalmomlogie à l'officine

Les hépatites virales

Rappelez-moi

Contact par mail

Contactez-nous au 02 41 32 42 42

fficinale.com/VIH

ur le web et dans Windows

Autotest VIH à l'officine

Présentation et objectifs pédagogiques

Quitter X

Objectifs pédagogiques

maformationofficinale.com, en partenariat avec la **Société Française de Lutte contre le Sida**, vous propose un module de formation pour que vous puissiez acquérir les compétences nécessaires.

Au terme de ce module, vous serez capable :

- d'accompagner une demande d'autotest de dépistage du VIH
- d'expliquer et de montrer à une personne le mode de fonctionnement de l'autotest
- d'appréhender une situation à risque et savoir y répondre
- d'orienter vers les dispositifs et structures de dépistage et de soins

précédent

suivant

© maformationofficinale.com

Chapitre 1

...

Le VIH

1.1 Histoire naturelle de l'infection

1.2 Epidémiologie

1.3 Modes de transmission

1.4 Prise en charge en cas d'accident d'exposition

1.5 Moyens de dépistage disponibles

© maformasonomonaie.com
et la Société Française de Lutte contre le Sida

Autotest VIH à l'officine

Chapitre 1 - Le VIH

1.5 Moyens de dépistage disponibles

Cette connaissance sur les marqueurs biologiques a permis la mise en place de 3 techniques de dépistage :

Tests rapides dont autotest

Ils comportent les TROD (test rapide d'orientation diagnostique) et les autotests.
Résultat **fiable 3 mois après la contamination**.
Test réalisé à partir d'une goutte de sang prise au bout du doigt (comme une glycémie), ou à partir de la salive.
Résultat disponible en moins de 30 minutes.
Les **TROD** sont proposés **gratuitement** par des centres de santé, certains services d'urgence, certains médecins généralistes et des associations de prévention.
Les **autotests** seront vendus en **pharmacie d'officine sans remboursement possible**.

© maformationomonaie.com

Autotest VIH à l'officine

Chapitre 1 - Le VIH

Quitter ✕

1.5 Moyens de dépistage disponibles

Exercice d'application

Une patiente vous confie qu'elle a pris un risque de contamination par le VIH il y a 8 jours. Elle vous demande à partir de quels délais elle pourra faire un test de dépistage qui lui certifiera qu'elle n'a pas été contaminée.

Que lui répondez-vous ?

Choisissez vos réponses dans la liste, puis cliquez sur " valider " pour confirmer vos choix.

- [x] **Dans 48H**
- [x] **Dans 5 semaines**
- [ ] **Dans 6 semaines**
- [ ] **Dans 3 mois**
- [ ] **Dans 6 mois**

Réponse

C'est exact.

Deux réponses sont possibles :

- Dans 48 heures

Dans le cas où la patiente présente des signes de primo-infection ou si elle est asymptomatique mais à risque important d'être contaminée, il pourra lui être proposé un test de recherche de l'ARN viral, fiable à partir de 10 jours après la contamination, soit dans 48 heures.

- Dans 5 semaines

Dans le cas où la patiente ne présente aucun signe de primo-infection et où le risque n'est pas très élevé, le médecin lui proposera d'attendre le délai classique de 6 semaines après la contamination, soit dans 5 semaines.

Il convient donc de conseiller à la patiente de consulter un médecin dans les jours à venir, dans un CDAG ou en ville. Ce dernier évaluera l'option et le délai de dépistage adaptés.

© maformationomcinsie.com
et la Société Française de Lutte contre le Sida

Chapitre 2

...

L'autotest

2.1 Réglementation

2.2 Présentation

2.3 Mode d'emploi

2.4 Interprétation des résultats

2.5 Questions fréquentes

Chapitre 3

...

Savoir gérer une demande d'autotest VIH à l'officine

3.1 Préparer les supports nécessaires

3.2 Conduite à tenir

3.3 Etudes de cas

Autotest VIH à l'officine

Chapitre 2 - L'autotest

Quitter

2.2 Présentation

Contenu du kit de l'autotest VIH®

Photo fournie gracieusement par la société AAZ-LMB.

- **A** **Le sachet** contient le kit.
- **B** **L'autotest.**
- **C** **La dosette de diluant** est amovible. Elle est située sur la partie haute de l'autotest et se retire pour réaliser le test.
- **D** **L'autopiqueur** génère la goutte de sang au bout du doigt du patient. Il est rétractable.
- **E** **Le pansement** est à appliquer sur le doigt après avoir recueilli la goutte de sang.
- **F** **L'absorbeur d'humidité** permet une bonne conservation de l'autotest.
- **G** **Le support** permet de contenir la dosette de diluant et d'y enfoncer ensuite l'autotest.
- **H** **La lingette désinfectante** sert à nettoyer le bout du doigt avant de le piquer.
- **I** **La compresse** sert à essuyer la première goutte de sang avant de prélever la deuxième pour le test.

© maformationofficinale.com

2.4 Interprétation des résultats

Le résultat est positif



Deux bandes apparaissent.

- Il faut effectuer rapidement un test de confirmation (sérologie combinée).
- Il est donc recommandé de consulter un médecin dès que possible (médecin traitant ou autre médecin de ville ou médecin dans un CDAG). Ce médecin orientera la personne vers un test de confirmation et l'accompagnera ensuite pour une prise en charge adaptée.
- Jusqu'au résultat de ce test de confirmation, il est conseillé à la personne d'éviter toute activité qui pourrait transmettre le VIH à d'autres personnes (rapports sexuels non protégés, échange de matériel lié à l'usage de drogues : injections, pailles de "sniff" ou pipe à crack, don de sang ou d'organes à exclure).

Si vous souhaitez voir la vidéo « Autotest VIH : mon résultat est positif si… » à destination des patients et réalisée par Sida Info Service, cliquez sur le pictogramme ci-contre.

© maformationonline.com

2.5 Questions fréquentes

Voici des questions que des patients pourraient vous poser...

- Que faire si je rencontre des difficultés lors de la réalisation de l'autotest ?
- Pourquoi faut-il réaliser le test sur la 2ème goutte de sang ?
- Pourquoi faut-il attendre 3 mois après une prise de risque pour réaliser l'autotest ?
- Si je prends des médicaments, cela peut-il agir sur le résultat du test ?
- Une fois utilisé, où dois-je jeter l'autotest ?
- Si quelqu'un manipule mon test après utilisation, peut-il être contaminé ?

... et les réponses que vous pourrez donner

L'autotest et l'autopiqueur (bien que rétractable) sont des déchets à risque infectieux. Ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.
Ils devront être jetés dans une boite spécifique (liste des points de collecteurs sur le site Internet de l'éco-organisme DASTRI).

© maformationonlinenais.com

Autotest VIH à l'officine

Quitter

Chapitre 3 - Savoir gérer une demande d'autotest VIH à l'officine

3.2 Conduite à tenir

© maformationomanaie.com

Autotest VIH à l'officine

Quitter

Chapitre 3 - Savoir gérer une demande d'autotest VIH à l'officine

3.2 Conduite à tenir

© maformationromansis.com

Autotest VIH à l'officine

Quitter ✕

Chapitre 3 - Savoir gérer une demande d'autotest VIH à l'officine

3.3 Etudes de cas

Ces quelques études de cas vous sont proposées pour vous mettre en situation.
Cliquez sur chaque vignette pour les découvrir.

"Je voudrais acheter un autotest pour faire le point sur le VIH."

"J'ai acheté l'autotest VIH chez vous ce matin. Il est positif !"

Cette adolescente vous demande un autotest VIH car elle a vu de la publicité sur internet.

Cet homme a eu un problème de préservatif avec sa partenaire, il vient acheter un autotest...

Ce symbole apparait sur la vignette une fois son contenu consulté.

© maformationonline.com
et la Société Française de Lutte contre le Sida

Quinze jours après la formation…

Autotest VIH à l'officine

Evaluation

Quitter

QUESTION 2/7

Concernant les modalités de bon usage de l'autotest VIH®

Choisissez votre réponse dans la liste proposée sous chaque flèche, en cliquant dessus. Une fois l'exercice terminé, cliquez sur " valider " pour confirmer.

Le support permet de contenir [la dosette de diluant] et d'y enfoncer ensuite [l'autotest].

L'autopiqueur est à usage [unique]. Il est [non rétractable].

Le test est réalisé sur la [ ] goutte de sang exprimée.

Appuyez [ ] p[ ] le test dans son support. On doit ressentir [ ] crans de résistance.

première
deuxième

Lisez les résultats au bout de [ ] minutes, sans attendre au-delà de [ ] minutes.

valider

© maformationofficinale.com et la Société Française de Lutte contre le Sida

Autotest VIH à l'officine

Evaluation

Quitter ✕

QUESTION 4/7

Si le résultat de mon autotest VIH est positif, que dois-je faire ?

Que répondriez-vous ?

Choisissez vos réponses dans la liste, puis cliquez sur " valider " pour confirmer vos choix.

- [x] Consulter un médecin dans un centre de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) ou en ville pour faire un dépistage du VIH
- [ ] Refaire un autotest VIH pour confirmer ce résultat
- [ ] Aller aux urgences
- [x] Appeler la ligne d'écoute de Sida Info Service au 0800 840 800 pour expliquer la situation

Réponse

Toutes vos réponses sont exactes.

Le résultat positif de l'autotest VIH indique que la personne est probablement séropositive. Ce résultat doit être confirmé par une sérologie combinée (Ac anti VIH + AgP24) en laboratoire.

Pour cela, vous pouvez conseiller à cette personne :
- de **consulter un médecin dans un CDAG** (où le dépistage sera réalisé sur place) **ou consulter un médecin en ville qui fera une ordonnance pour un dépistage en laboratoire**.
- ou **d'appeler la ligne d'écoute de Sida Info Service**.

Les autres propositions ne sont pas adaptées à la situation : refaire un autotest ne permettra pas de confirmer la séropositivité (il faudra dans tous les cas confirmer le résultat en laboratoire), et aller aux urgences ne permettra pas non plus d'accéder à un test de confirmation de la séropositivité.

Poursuivez !

suivant ⇨

© maformationofficinale.com et la Société Française de Lutte contre le Sida

Nombre de personnes ayant suivi la formation





Commentaires des apprenants
(2000 questionnaires remplis, 7 items, note 1 à 10)



Evaluation (15 jours après la formation):
2196 personnes ont ouvert le test, dont **676** l'ont terminé

Perspectives

- Accès tablette à partir de l'année 2016
- Selon la même méthode, il est envisagé d'élaborer un module sur l'accompagnement des patients sous traitement antirétroviral à l'officine

Merci au groupe M/P SFLS et à l'équipe « Ma Formation Officinale »

www.maformationofficinale.com

http://www.sfls.aei.fr/Commission-pharmaciens-medicaments

Contact : jlanglois.pharma@gmail.com